



失語症是一種語言失調。

失語症患者有說話、理解、閱讀、書寫及算數方面的困難。

失語症的原由總是腦部受損。

通常是因為中風，不過意外或腫瘤也有可能造成失語症。



腦部血流突然受阻時，中風就會發生。這有可能以二種型式發生：血管阻塞或血管滲漏。

梗塞：

由於血管壁增厚 (thrombosis：血栓症) 或血管阻塞 (embolism：血管栓塞)。這通稱為腦部梗塞。



滲漏：

血管內形成軟化的部分 (aneurysm：動脈瘤)；其上進而生成孔洞，因而開始滲漏或爆裂。這被稱為腦內出血。

醫生大多稱中風為 CVA：腦血管意外 (Cerebral Vascular Accident)。



語言在我們的日常生活中扮演重要角色。我們使用語言與其他人交談、閱讀報紙、工作、學習、闡敘想法、計畫未來。

失語症患者在發病前能正常表現的各方面都可能會有問題：

- 交談
- 與多人對話或在吵雜的環境下談話
- 閱讀書報、雜誌或交通標誌
- 了解、說笑話
- 理解電視、廣播節目
- 寫信、填表格
- 打電話
- 加總、記得數字或付錢
- 說自己或家人的名字



失語症患者有語言困難，但他們不是神智不清！

大多數失語症患者都會發現他們的生活**改變**很多。以前熟稔的事物，現在需要花費更多的**時間、精力**。多數的患者會感覺不安並**擔憂**日子該怎麼過。週遭的**幫助、扶持**因而相當重要。與其他失語症患者見面也有幫助。失語症患者也能**不用言語**就相互了解。

你能為自己做什麼？

- 告訴他人你是失語症患者
- 隨身帶著小卡片，其上面說明失語症是什麼
- 若談話效果不佳，試著用**手勢、畫圖、寫字或手指**來釐清您的意思
- 向家人或朋友求助
- **事先籌畫**—預先在腦海中或紙上準備對話
- 與他人分擔您的憂愁；不要獨自憂慮

